

बोर्डो मिश्रण तथा बोर्डोपेष्ट तयार गर्ने तरिका

निलो तथो, चुना र पानीको मात्रा मिलाई तयार पारिएका बोर्डो मिश्रण तथा बोर्डोपेष्टलाई एकदमै राम्रो तामायुक्त दुशीनासक विषादी रूपमा मानिन्छ। यी विषादीहरू प्रायःसबैजसो फलफूलका जरा, फेद, हाँगा तथा पातमा लाग्ने दुसी र शाकाणु जन्तु रोगहरू नियन्त्रणको लागि प्रयोग गरिन्छ।

बोर्डो मिश्रण (Bordeaux Mixture)

बोर्डो मिश्रण निलोतुथो, चुना (घरपोत्ने राम्रो गुणस्तरको चुना) र पानीको मिश्रणबाट तयार गरिन्छ। यसलाई ५:५:५० भागमा बनाइन्छ। त्यो भनेको १०० ग्राम निलोतथो : १०० ग्राम चुना : १० लिटर पानी जुन करिब १ प्रतिशतको भोल वुभाउछ।

बनाउने विधि

- एउटा प्लास्टिकको बाल्टिन वा माटोका भाडोमा पिसेर धुलो बनाएको १०० ग्राम निलोतुथोलाई एक लिटर पानीमा र अर्को प्लास्टिकको भाडोमा १०० ग्राम चुनालाई एक लिटर पानीमा मिसाएर लड्थीले चलाएर घोल्ने।
- निलोतुथो पानीमा घोल्दा यसलाई मलमलको कपडामा पोको पारेर आधा भाग पानीमा डुबाउने र आधाभाग पानी माथि पर्ने गरी राखेमा राम्रोसँग घुल्छ।
- दुबै घोललाई तेश्रो भाडोमा बिस्तारै दुबै एकै पटक पर्ने गरी लड्थीले घोल्दै राखेर मिसाउने र थप ८ लिटर पानी मिसाएर राम्रोसँग घोल्ने।
- तेश्रो भाडो उपलब्ध नभएमा निलोतुथोको घोललाई चुनाको घोलमा लड्थीले घोल्दै हाल्ने र १० लिटर पानी मध्ये बाकी रहेको सबै पानी सोही भाडामा राखी बेस्सरी चलाएर घोल्ने।

बोर्डो पेष्ट (Bordo Paste)

बिरुवा काटिएको, वोटको फेदमा, काँटछाँट गरिएको ठाउँमा लगाउन यसलाई मलहमको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यसलाई बोर्डो मिश्रण बनाउने विधि अनुसार नै बनाइन्छ। तर फरक के छ भने यसमा पानीको मात्रा कम लाग्छ।

बनाउने विधि

- १०० ग्राम निलोतुथोको धुलोलाई एउटा प्लास्टिकको भाँडोमा २०० मिलिलिटर पानीमा र १०० ग्राम चुनालाई अर्को प्लास्टिकको भाँडोमा २०० मिलिलिटर पानीमा मिसाएर घोल्ने।
- घोल तयार भएपछि दुबै घोललाई तेश्रो भाडोमा बिस्तारै दुबै एकै पटक पर्ने गरी लड्थीले घोल्दै राखेर मिसाउने र बाँकि ६०० मिलिलिटर पानी मिसाएर एक लिटरको पेष्ट तयार गर्ने।

नोटः

- तयार गरिएको बोर्डो मिश्रण वा पेष्ट ठिक छ या छैन जाचन फलामको खिया नलागेको काठीलाई उक्त घोलमा केहीबेर चोपी राख्दा काठी रातो भएमा मिश्रण अम्लीय भएको वा निलोतुथोको मात्रा बढि भएको बुझ्नु पर्दछ केहि मात्रामा चुना थप्नु पर्छ। अन्यथा तामाको असरले बिरुवा मर्न सक्छ।
- कलिला बिरुवामा माथि उल्लेखित अनुपात बिषालु हुनसक्ने भएकोले निलोतुथोको मात्रा घटाउनु पर्दछ।
- घोल तयार भएको १२ घण्टा भित्रै बिरुवामा छरी सक्नु पर्दछ। अन्यथा यसको असर बिरुवामा पर्दैन र भुन बिरुवालाई नराम्रो असर पार्न सक्छ।
- पेष्ट तयार गर्दा कुनै धातुका भाडाहरू प्रयोग गर्नु हुदैन।
- मौसम बढि ओसिलो वा बढि सुख्खा भएको अवस्थामा यो मिश्रण बिरुवामा छुर्नु हुदैन।

