


बगैचा सरसफाई तथा मल हाल्ने

अनावश्यक झारपात गोडमेल गर्ने, सुन्तलाको बोटलाई घाम छेक्ने र बोटमा आएका ऐजेरु, झ्याउ र आकाशेबेलीका लहराहरु हटाउने र झरेका फल जम्मा गरि नष्ट गर्ने आदि क्रियाकलापद्वारा बगैचा सफा राख्नु पर्छ ।

ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु

- मुख्य खाधतत्व तान्ने जरा (feeder roots) जमिन भन्दा १० से मि तल फैलिने हुनाले धेरै गहिराईमा मलखाद दिनु हुन्न ।
- रासायनिक मल हाल्दा मूल फेदमा नपर्ने गरि हाल्नु पर्दछ भने नकुहिएको/नपाकेको प्राङ्गारिक मल जरामा दिनाले नकारात्मक प्रभाव पर्न जान्छ ।
- प्राङ्गारिक मल हाल्दा नया पालुवा आउन भन्दा अलिकति अघि (पुस-माघ) र रासायनिक मल हाल्दा नया पालुवा आउनासाथ हाल्नु पर्छ ।
- सुक्ष्म खाधतत्व माटोमा मिसाएर वा स्प्रे गरेर पूर्ति गर्न सकिन्छ । सुक्ष्म खाधतत्व स्प्रे सम्भव भएसम्म एक महिना अन्तरालमा पटक पटक छरेको बढी प्रभावकारी हुन्छ ।
- जरा/काण्ड कुहिएको बोटहरुमा सामान्यता विभिन्न खाधतत्व कमीका लक्षणहरु देखिने गर्दछ ।
- मलको मात्रा बिरुवाको उमेर, माटोको अवस्था र भौगोलिक अवस्थामा पनि भर पर्छ ।
बिरुवाको उमेर(वर्ष) युरिया : डी ए पी : पोटास (ग्राम)
१ ५०:२५:५०
२ १००:५०:१००
३ १५०:७५:१५०
५ २५०:१२५:२५०
१० वर्ष ५००:२५०:५००
नाइट्रोजन युक्त मल एकै पटक नभई Split dose (१. फूल फुल्न भन्दा १५ दिन अघि २. फलको साइज बढ्ने बेला) मा दिएको उपयुक्त हुन्छ ।



बोटको काँटछाट

काट्ने समय


- सामान्यता सुन्तलाजात फलफूलको काँटछाट फल लिईसके पछि हिउद महिना(पुष-माघ) मा गरिन्छ ।
- चोर हाँगा तथा रोग किरा लागेको हाँगा जतिबेला पनि हटाउन सकिन्छ ।

काट्ने तरिका

- मूल हाँगा लामो भई काँटछाट गर्नुपर्दा उक्त हाँगा नुहाउदा जहाँबाट नुहिन्छ त्यहि भागबाट काट्ने तर नया पलाउने मुना बाहिरपट्टि पार्नुपर्छ ।
- मझौला रुखमा जमिनभन्दा ५० से मि माथि सम्मको हाँगाहरु र तुला रुखमा करिब १ मिटरसम्मको हाँगाहरु सबै हटाउनु पर्छ ।
- सुकेका, लत्रेका, निहुरिएका, रोगि हाँगा, लछारिएका, खट्टिएका, घाम नपर्ने र चोर हाँगा (च्याष्टो डाठ भएको) सबै हटाउनुपर्छ ।
- हाँगा काट्दा घाउ सानो पर्ने गरि, नलछारिकन काट्नु पर्छ भने काटे लगत्तै बोर्डो पेष्ट लगाउनु अनिवार्य हुन्छ ।

बेसिन बनाउने

- ४-५ वर्ष भन्दा बढी उमेरका बिरुवा वरिपरी करिब १-१.५ मिटर मा बेसिन तयार गरि जरा नकाटिने गरि मलजल गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।



सुन्तला बगैचा व्यवस्थापन



लेखक

विनोद हमाल (प्रमुख, अधिकृतस्तर दशौ)
विकाश वि क (बागवानी विकास अधिकृत, सातौ तह)



गण्डकी प्रदेश सरकार

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि ज्ञान केन्द्र, स्याङ्जा

- www.syangja.akc.gov.np
- akcsyangja@gmail.com
- ०६३-४२०१३०

सिचाई, निकास र मल्विंड व्यवस्थापन

सिचाई

- बगैचामा मल राखे लगतै यदि माटो सुख्खा छ भने सिचाई अनिवार्य हुन्छ ।
- वर्षात सकिए लगतै करिब मंसिर/पुस सम्म माटोमा चिस्थान पुगेपनि पुस देखि चैत्र/बैशाख सम्म सुख्खायाममा सिचाई गर्नु पर्छ नत्र सुन्तलाको वृद्धिविकास र उत्पादन घट्न जान्छ ।
- सुन्तलामा सकेसम्म माटोमा चिस्थानको मात्रा हेरी गर्मीमा १५ दिनको अन्तराल र जाडोमा १ महिनामा सिचाई दिनु उपयुक्त हुन्छ ।
- नया पालुवा पलाउने बेला, फूल फुले/दाना लाग्ने बेला र फलको दानाको साइज बढ्ने बेला सुन्तलामा सिचाई अनिवार्य गरिनुपर्छ ।
- सिचाई गर्दा बेसिन बनाएर जरामा पानी नजम्ने गरी गर्नुपर्छ ।



निकास

- सुन्तलामा सिचाई संगसंगै निकासको प्रबन्ध गर्नु अपरिहार्य छ नत्र भने पानी जमेर जरा र काण्ड कुहिने समस्याले गर्दा बिरुवामा खाधतत्वको कमिका लक्षणहरु देखिन थाल्छन ।

मल्विंड

- सुन्तला बोट वरिपरी प्राङ्गारिक मल्विंड (पात पतिंगर, धानको भूसा, झारपात आदि- कम्तिमा ३ इन्च बाक्लो) र प्लास्टिक मल्व दुवै प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
- सामान्यता मल्विंड भदौ/असोजमा गरेर वर्षात सुरु हुन अघि लगतै हटाई हाल्नु पर्छ नत्र मल्विङले गर्दा जरा वरिपरी अक्सिजनको कमि, अत्याधिक तापक्रम र आद्रता बनाई बोटको वृद्धिविकासमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ ।



बगैचाभित्र खनजोत र अन्तरबाली



- सुन्तला बगैचामा छोटो समयमा र कम गहिराईमा जरा विकास हुने खालका बालीहरु जस्तै काउली, बन्दा, साग, लसुन, प्याज आदि बोटको वरिपरी तयार गरिएको बेसिन भन्दा पर जरालाई असर नपर्ने गरि सामान्य खनजोत गरेर गर्न सकिन्छ ।
- तर मिनीटिलर/कोदाली ले जरा काटिने गरि खनजोत गर्दा पछि वर्षायाममा जरा कुहिने र लगतै बोटहरु पहेलो हुने/सुक्ने हुन्छ ।

बोर्दो पेष्ट र बोर्दो मिश्रण तयारी

बोर्दो पेष्ट

- १ के जी निलो तुथोलाई ५ लिटर पानीमा र १.५-२ के जी चुनलाई अर्को ५ लिटर पानीमा छुट्टा छुट्टै बाल्टीमा राम्ररी घोले ।
- एउटा १० लिटरको बाल्टीमा एकैपटक निलो तुथो र चुनाको घोल विस्तारै संगसंगै हाल्ने र मज्जाले घोले ।
- यसरी तयार गरेको बोर्दो पेष्टमा ४००-५०० मि लि आलसको तेल हालेर प्रयोग गरेमा पानीले नबगाउने र कल्ले किरा कम गर्छ ।
- काँटछाँट गरे पछि र बोटको फेद, बोक्रा कुहिएको भागमा बोक्रा फालेर बोर्दो पेष्ट लगाउन सकिन्छ ।

बोर्दो मिश्रण

- १०० ग्राम निलो तुथोलाई ५ लिटर पानीमा र १५०-२०० ग्राम चुनलाई अर्को ५ लिटर पानीमा छुट्टा छुट्टै बाल्टीमा राम्ररी घोले ।
- एउटा १० लिटरको बाल्टीमा एकैपटक निलो तुथो र चुनाको घोल विस्तारै संगसंगै हाल्ने र मज्जाले घोले ।
- यसरी तयार गरेको बोर्दो मिश्रणलाई सुन्तला बगैचामा दुसीजन्य रोग नियन्त्रण गर्न पात भिन्ने गरि स्प्रे गर्नु पर्छ ।



खनिज तेल स्प्रे

- बोटको पातको दुवै भाग राम्ररी भिन्ने गरी खनिज तेल (सर्भो तेल) ५-१० मिलि प्रति लिटर पानीमा मिसाई १/१ महिनामा स्प्रे गर्नले लाही, पतेरा, मिलिबग, सिल्ला, कल्ले किरा र लिफ माइनर किराको प्रकोप कम गर्न सकिन्छ ।



बाली संरक्षण

- क्याराथेन २ मिलि प्रति लिटर : खराने/धुले दुसी
 - १% बोर्दो मिश्रण स्प्रे : खराने/धुले दुसी, क्यान्कर, दादे रोग, गूद निस्कने
 - कासुगामाइसिन २ मिलि प्रति लिटर : कोत्रे रोग
 - बोर्दो पेष्ट लगाउने : पिंक रोग, जरा/फेद कुहिने रोग
 - सर्बो तेल ५-१० मिलि प्रति लिटर : कल्ले किरा लगायत अन्य रस चुसे किराहरु
 - इमिडाक्लोप्रिड ०.३-०.५ ग्राम प्रति लिटर : कल्ले किरा, पतेरा, मिलि बग लगायतका रस चुसेकिराहरु र पात खन्ने किरा
 - फेनीट्रोथिएन ०.५ ग्राम प्रति लिटर वा बुप्रोफेजिन १ ग्राम प्रति लिटर पानी : हरियो पतेरा
 - प्रोटिन चारोयुक्त पासो (प्रोटिन चारो र मालाथियन १०:१ मा १५ दिनको अन्तराल वैशाख अन्तिम-असारमा प्रयोग गर्ने): फल कुहाउने औसा नियन्त्रण
- ५० ग्राम प्रोटिन चारो, २० मिलि मालाथियन र १० मिलि स्टिकर लाई १० लिटर पानीमा मिसाई सुख्खा र घाम लागेको समयमा प्रत्येक दोस्रो बोटमा ५० मिलि छर्ने

