



गण्डकी प्रदेश सरकार
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय
कृषि विकास निर्देशनालय
कृषि ज्ञान केन्द्र, स्याङ्गजा

व्यावसायिक आलु उत्पादन प्रविधि

गण्डकी प्रदेशकै आलु उत्पादनको हिसाबले निकै सम्भावना बोकेको स्याङ्गजा जिल्ला पोखरा र बुटवल जस्ता ठुला बजारको बीचमा पर्दछ । मध्यम खाले एउटा आलुको डल्लोमा ११२ क्यालोरी उर्जा, २०% स्टार्च, २% प्रोटीन, १% खनिज र ८०% पानी हुन्छ ।

हावापानी तथा स्थानको छनौट

- समथर, पानीको निकास राम्रो भएको र सकभर बाटो नजिकको क्षेत्र उपयुक्त हुन्छ ।
- मध्यम निकास हुन सक्ने खालको हल्का भिरालो जमिन उपयुक्त हुने र बढी भिरालो जमिनमा तेर्सो ड्यांग बनाएर खेति गर्न सकिन्छ ।
- १५-१८ डिग्री सेल्सियस तापक्रम आलु खेती को लागि अत्यन्तै राम्रो मानिने र १० डिग्री भन्दा कम र ३० डिग्री भन्दा माथिको तापक्रमले आलुको वृद्धि विकास र उत्पादनमा नकारात्मक असर पर्दछ ।
- प्रशस्त प्रांगारिक पदार्थ, राम्रो निकास, हल्का दोमट माटो, पि एच ६ देखि ७.५ भएको माटो उपयुक्त मानिन्छ ।

जातहरू

- कुफ्री ज्योति
- कुफ्री सुन्दरी
- जनकदेव
- खुमल उज्जवल
- खुमल उपहार
- कार्डिनल
- डेजिरे
- एम एम निलो

बीउ आलुको छनौट

- भरपर्दो ठाउँ र श्रोत बाट खरिद गरिएको बीउको छनौट
- जातीय मिश्रण भएको, रोग व्यथिग्रस्त र कमसल बिउ प्रयोग गर्न नहुने
- एउटा आलु बीउमा कम्तिमा २-४ वटा तुसाहरू हुनु उपयुक्त हुने



बीउ टुसाउने काम



रोप्नु भन्दा ३ देखि ६ हप्तासम्म न्यानो (१५-२० .से तापक्रम) हावा लाग्ने कोठा वा वरण्डा वा छानामुनि १-२ तहसम्म फिजाएर उज्यालो तर सिधै घाम नपर्ने ठाउँ मा राख्नु पर्छ । तापक्रम र आद्रता मिलाउन भिजाएको बोराहरू एक छेउमा झुन्ड्याईदिनु पर्दछ । यदि आलुको दानाको टुप्पामा एउटा मात्र टुसा आएको छ भने त्यो भन्चिदिनाले अरु थप टुसाहरू निस्कन्छ । अध्यारोमा राखेको बीउ आलु बाट सेता, कमजोर टुसाहरू निस्कने हुन्छ ।

बीउ स्याहार र संहार

- बीउको लागि प्रयोग गरिने आलु शित भण्डार बाट रोप्नु भन्दा २०-३० दिन अगाडी निकाल्नु पर्दछ । बाहिरी तापक्रमसंग बीउको तापक्रममा सामन्जस्य ल्याउन बोरा खोली बीउ आलु छायामा फिजाई सडेगलेको आलु हटाउनु पर्दछ । फिजाउदा आलुमा पसिना निस्कन्छ त्यसकारण आलु राम्ररी ओभानो भैसकेपछि मात्र बोरा भरेर टाढा पठाउने वा लैजाने काम गर्नु पर्दछ ।



बीउ आलु काट्ने तरिका

- बीउ आलु ठिक्क साइज (२५-५० ग्राम सम्म) रोप्नु उपयुक्त हुन्छ । यदि ठुलो साइजको बीउ छ भने दुई फ्याक हुने गरी ठाडो गरि काट्नु पर्दछ । प्रत्येक टुकामा कम्तिमा पनि २-३ वटा आँखाहरू हुनु पर्दछ । काटेको बीउ आलुमा इन्डोफिल एम ४५ एक ग्राम प्रतिकिलो बीउमा छारिदिनुपर्दछ । मसिनो, लामो टुसा भएको, धेरै चाउरी परेको बीउ आलु ठुलो भएपनि काट्नु हुदैन । काटेको बीउबाट उत्पादित आलु अर्को वर्ष बीउको लागि प्रयोग गर्नु हुदैन ।

जमिनको तयारी

- २५-३० से मि गहिराइ सम्म फैलिने भएकाले सो गहिराइ सम्म माटो खुकुलो बनाउन पर्ने छ । एक पटक हल्का सिचाई दिए पछी लगत्तै ३-४ पटक राम्ररी गहिरो गरी जोतेर डल्ला फुटाई, झारपात हटाई र खुकुलो पारेर जग्गा तयार गर्नु पर्छ ।

मलखाद व्यवस्थापन

- प्रति रोपनी क्षेत्रफलमा २ टन कम्पोष्ट मल, १२ के जी डी ए पि , ७ के जी युरिया र ५ के जी पोटास मल प्रयोग गर्नु पर्छ ।
- कम्पोष्ट मल आधा देखि तिन चौथाई भाग दोस्रो पटक जग्गा जोल्नु अगाडी छारिदिने, बाँकी कम्पोष्ट मल र रासायनिक मल आलु रोप्ने कुलेसोमा राख्दा उपयुक्त हुन्छ । १/२ भाग युरियाको रुपमा आलु गोडेर उकेरा लगाउने समयमा टपट्रेस गर्नु उपयुक्त हुन्छ



आलु रोप्ने तरिका

- ड्यांग देखि ड्यांग ७५-८० से.मि र बोट देखि बोट २५-३० से.मि को दुरी र १५-२० से.मि अग्लो ड्यांग बनाएर त्यसमा १०-१५ से.मि गहिराइमा र एकै दिशा पारेर आलु बीउ रोप्नु उपयुक्त हुन्छ ।
- आवश्यक बीउ आलु प्रति रोपनी : ७५-१०० के जि
- सानो ड्यांगमा आलु को दाना सानो हुने र दाना पनि कम हुने समस्या आउछ ।
- तापक्रम बढी भएमा गहिराइ कम र तापक्रम कम भएमा बढी गहिराइमा बीउ आलु रोप्नु पर्दछ ।
- माटो सुख्खा रहने र सिचाई कम भएको ठाउँमा सकभर माटोलाई कम चलाई चिस्यान उड्न नदिन र आलु उप्रन भन्दा पहिले बीउमा तुषारोमा असर पर्न नदिन १० देखि १५ से.मि. गहिरो मा रोप्नु उपयुक्त हुन्छ ।



सिचाई र गोडमेल

- सिचाई : १ के जी आलु फाल्न ३००-६३६ लिटर सम्म पानी आवश्यक पर्छ । सामान्यता उम्रने अवस्था, त्यान्द्रा निस्कासनको अवस्था, आलु दाना लाम्ने अवस्था र दाना बढ्ने अवस्थामा आलु लाई सिचाई आवश्यक पर्ने गर्छ । यदि १०-१२ घण्टा लगातार पानीमा आलुका दाना डुबेमा त्यसले दाना कुहाउने साथै आलुको बोटको वृद्धि विकासमा प्रतिकूल असर पर्न जान्छ ।
- गोडमेल र उकेरा : उकेरा राम्ररी नदिएमा जमिन मुनीको त्यान्द्रा र दानाको वृद्धि विकास राम्ररी हुन सक्दैन । सिचाई र मलखाद दिनु अघि आलुमा आएका झारपात हटाउनु पर्छ नत्र झारपात ले मल, सिचाई, ठाउँको लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने र रोग किरा पनि सार्न सक्ने भएकाले आलुमा झारपात आउन दिने हुदैन । झार नियन्त्रण गर्न मेट्रिब्युजिन को प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
- उकेरा दिदा घानाको उचाई २५ से.मि, ड्यांग को टाउको को चौडाई १५ से.मि र ड्यांग को तल बेसतिरको चौडाई ५० से मि व्यवस्थापन गर्नु अति उपयुक्त मानिन्छ । उकेरा दिदा बोट, त्यान्द्रा र आलुको दानामा चोटपटक लाग्नु हुदैन र धेरै सुख्खा र गिलो माटोमा उकेरा लगाउनु हुदैन ।
- माटो नबग्ने भएमा एक पटक मात्र उकेरा दिए पनि पर्याप्त हुन्छ ।
- आलुको दाना माटो बाहिर देखिएमा दानामा हरियोपना आउने र आलुको पुतली ले अण्डा पारिदिने र सो किराले भयावह क्षति पुर्याउन सक्ने हुनाले आलुमा उकेरा अनिवार्य रुपमा लगाउन पर्छ ।



आलु खन्ने र बाली भित्रयाउने

खन्ने

बोट पहेलिएर सुक्न थालेपछि र आलु दानको बोक्रा छिप्पिन थालेपछि आलु खन्न लायक हुन्छ । आलु छिप्पिएर खन्नु भन्दा १०-१५ दिन अघि दानालाई जमिनमुनि नै छाडी बोट उखेली दिने (Haulm Pulling) र लगतै सिचाई दिन रोक्नु पर्छ । आलु खन्दा आलु दाना नकाटिने गरि खन्नु पर्छ ।



ग्रेडिङ्ग

बजारमा मागका आधारमा आलु प्याक गर्नु पूर्व विभिन्न साइजका दानाहरु ग्रेडिङ्ग गरि छुट्याउन पर्छ र साधारणतया मझौला र ठुला साइजका दानाहरु ग्राहकले रुचाउने हुन्छ ।

ओसारपसार र भण्डारण

आलु खानिसकेपछी १५ दिनसम्म फिजाई दाना सुखिसकेपछी बजार र शीतगृहमा लोड अनलोड गर्दा जथाभावी लछार पछार गर्दा आलु थिचिएर आलु फुट्ने, कालो दाग पर्ने, जालीदार जुटको बोरामा ओसार पसार गर्नु पर्ने र प्लास्टिकको बोरामा आलु गुम्सिएर बिग्रने हुन्छ ।




तुरुन्तै खनेको र शीत गृह बाट निकालेको आलु गर्मी मौसममा ओसारपसार गर्नु हुदैन । वायुको संचार भएको र तापक्रम र आदर्ता व्यवस्थापन गरि लामो समयसम्म भण्डारण गर्न सकिन्छ ।



आलु खेती गर्दा ध्यान दिनपर्ने कुराहरु

- बीउ आलुको प्रत्येक दानामा २-३ वटा छोटो, मोटो, हरियो र बलियो टुसाहरु आएमा रोप्न उपयुक्त मानिन्छ ।
- अगौटे डढुवाको लागि क्लोरोथालोनिल ७५% WP १.५ ग्राम प्रति लिटर पानीमा दरले १० दिनको अन्तरमा बोट भिज्ने गरि ३ पटक छर्न सकिन्छ ।
- पछौटे डढुवाको लागि सुरुवातमा म्यान्कोजेब २.५ ग्राम/लिटर ७ दिनको अन्तरमा ४-५ पटक छर्ने र रोगको संक्रमण लागेमा मेटाल्याक्सिल १.५ ग्राम/लिटर वा डाइमेथोमर्फ १ ग्राम/लिटर १० दिनको अन्तरमा ३-४ पटक छरेमा रोग रोकथाम हुन सक्छ ।
- बोरिक एसिड २-३% को घोलमा उपचार गरि बीउ आलुलाई भण्डारण वा रोपेमा कालो खोष्टे र दादे रोग कम हुन सक्छ ।
- सिंचाई नभएको ठाउमा कुनै पनि हालतमा व्यावसायिक आलु खेति गर्नु हुदैन ।
- पछौटे डढुवा रोगको छिटो र तत्काल उपयुक्त उपचार गर्न सकिएन भने एकै रातमा तपाईको आलु स्वाहा हुन्छ ।



लेखक:

विनोद हमाल(प्रमुख, अधिकृतस्तर दशौ)
विकाश वि क(बागबानी विकास अधिकृत, अधिकृतस्तर सातौ)

आलुमा खाद्यतत्व कमीका लक्षण



औधोगिक उत्पादनको हिसाबले आलुमा आवश्यक मल प्रति रोपनी

- गोठे मल १.५ टन
- युरिया १२ के जी
- पोटास मल १५ के जी
- डि.ए.पि मल २२.५ के जी
- एग्री जिन्क १.५ के जी
- शुष्क तत्व (समयसमयमा स्प्रे गर्ने)



गण्डकी प्रदेश सरकार
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय
कृषि विकास निर्देशनालय
कृषि ज्ञान केन्द्र, स्याङ्गजा